

Ushqimi optimal gjatë fazës tranzitore

Kalim pa probleme në laktacionin e radhës

*Referat nga z. Franz Riegler, konsulent dhe bashkëthemelues i Austria Prämix
SHPK*

Lopët me rendiment të lartë kanë një bilanc negativ të energjisë në fund të periudhës së barsmërisë dhe në fillim të laktacionit.

Mobilizimi i tepërt i yndyrës trupore mund të shkaktojë një mbingarkesë të shpejtë të metabolizmit të mëlçisë. Pasojat janë ketoza dhe sindroma e mëlçisë së dhjamosur. Kjo shoqërohet me një status të reduktuar të imunitetit dhe rënie në mënyrë të ndjeshme. Në këtë fazë të rëndësishme tranzitore, aplikimi i produkteve të lëngshme dhe të thata të Schaumann (Austria Prämix sh.p.k) rezulton shumë i suksesshëm. Në qendrën eksperimentale të Fa. Schaumann është zhvilluar së fundmi produkti special për mbrojtjen e rumenit, i cili është i pajisur me carnitinë dhe ka rezultuar shumë i suksesshëm. Bazuar në rezultatet pozitive, u krijua Rindavital C Plus, një përzierje substancash optimale me efekt të ndjeshëm mbi metabolizmin e energjisë në të ushqyerit e kësaj faze. *Energizer Schaumann C Plus* është një suplement i avancuar për të përmirësuar furnizimin me energji në fund të periudhës së tharjes dhe gjatë laktacionit të hershëm.

Rindavital C Plus


Përveç carnitinës së mbrojtur, Rindavital C Plus përmban dhe glukozë, maja dhe vitaminë E. Kjo përzierje e shijshme mund të përdoret në çdo racion ushqimor. Kontrolli i provave të gjakut tek lopët pas pjelljes, për acidet yndyrore të lira dhe betahydroxybutyrate, dha rezultate shumë pozitive. Grafiku 1 tregon rezultatet e betahydroxybutyrate në javën e parë dhe të tretë të laktacionit. Që në javën e parë të laktacionit, konstatohet rënie e ndjeshme e kësaj vlere, e cila vazhdon të bjerë përsëri në mënyrë të konsiderueshme dhe pas dy javësh. Edhe pse në këto kushte nuk mund të përjashtohet demobilizimi i yndyrave trupore, përsëri nuk kemi stres

të mëlçisë. Ky lehtësim i metabolizmit kontribuon për një rendiment të lartë (shih grafikun 2). Që pas disa ditësh, lopët tek të cilat u përdor Rindavital C Plus, shfaqën një ecuri të ndjeshme në rendiment, i cili arrin në 5 kg gjatë fazës kritike në javën e dytë dhe të tretë të laktacionit. Suksesi në praktikë konfirmon dhe rezultatet e eksperimentit. Efekt pozitiv është konstatuar edhe tek lopët simental me kondicion mbi normë, duke mundësuar start pa probleme në laktacionin e parë.

Rindavitali i ri C Plus është çelësi për:

- Rritje të konsumit të ushqimit
- Forcim të vitalitetit të viçave
- Rritja të rendimentit tek mëshqerrat dhe lopët
- Persistencë e përmirësuar e prodhimit të qumështit
- Reduktim i ndjeshëm i rrezikut të ketozës
- Fertilitet i sigurtë.

Fig . 1: Beta-Hydroxybutyrat gjate javes 1 dhe 3 pas pjelljes




Në një aplikim gjashtë javor të Rindavital C Plus, rekomandohet përdorimi i 100g/ditë, për lopët që duhet të marrin një aplikim tre javor rekomandohen 200g/ditë. Pas pjelljes mjaftojnë 100g në ditë për mbulimin e nevojave të organizmit.

Rindastar Start C Plus

Rindastar C Plus është një produkt i ri, inovativ në linjën e ushqimit të gatshëm, që përmban yndyrë të mbrojtur, metionine të mbrojtur, komponentë glucoplastikë, glycol propylene dhe glicerinë, vitaminë E, niacinë, biotinë, mikroelementë të lidhur organikisht, si edhe carnitinë për mbrojtjen e rumenit. Rindastar Start C Plus aplikohet më së miri gjatë fazës tranzitore. Gjatë

Fig. 2: Rendimenti i qumështit tek lopet me te vjetra me apo pa perdorim te RINDAVITAL C PULS qumesht kg/dite



kësaj periudhe që shoqërohet me një bilanc negativ energjie dhe sintezë

mikrobiale të reduktuar të proteinave, mundësohet nëpërmjet yndyrave të mbrojtura një burim energjie me vlera të larta.

Komponentët glukoplastikë përbëjnë elementet bazë në sintezën e sheqerit në gjak, jetike për jetën e lopëve. Biotin, niacin dhe carnitin plotësojnë njëri-tjetrin, mbështesin sintezën e sheqerit në gjak dhe kanë një efekt pozitiv në rumen dhe metabolizmin e energjisë. Me nxitjen e djegies së yndyrës ulët sasia e acideve të lira yndyrore. Bie ndjeshëm mbingarkimi mëlçisë. Të lidhur organikisht, zinku, bakri, mangani dhe seleni kanë një disponibilitet të lartë organik.



Doza më efektive është 1kg për lopë në ditë, duke filluar minimalisht tre javë para pjelljes. Pas kësaj periudhe, të ushqyerit duhet të vazhdojë me 1-1,5 kg për lopë në ditë. Krijoni kushtet për pjellori më të lartë dhe rendiment të kafshëve tuaja! Me formulimin e ri Rindavital C Start dhe Rindastar C Plus lopët janë të përgatitura mirë për fazën e tranzicionit.

