

Plani i pirjes te vikat e qumështit deri në shkëputje



Zakonisht rritja e shëndetshme e vicave zgjat deri në dymbëdhjetë javë

Për një rritje "normale" dy javore nevoiten 55L kulloshtër - ose qumësht i plotë, 470 Litër qumësht i ftohtë, 80 deri 110 kg starter (koncentrat për vica) dhe rreth 50 kg bar ose kashtë Plani i pirjes dhe ushqimit:

Mosha në javë	L/Vakt	Ujë	Koncentrat viçash (Starter)	Bar
2	2.5	Sipas dëshirës	Sipas dëshirës deri rreth 1.5 kg	Sipas dëshirës
3	3.0			
4	3.5			
5	4.0			
6	4.0			
7	3.5			
8	3.0			

Në javët e para të jetës (rreth 40L në javët e para të jetës)! Dhënia e kulloshtërës së parë 2L. Menjëherë pas lindjes dhënia e „KALBI VITAL”

Në javën e dytë fillon dhënia e koncentratës për vica (starter). Vicit duhet ti ofrohet bar i thatë cilësor dhe kashtë sipas dëshirës gjatë gjithë fazës së rritjes. Koncentrati i vicave (starteri) duhet të ofrohet gjatë gjithë periudhës së rritjes d.m.th. deri sa konsumi ditor të arrij 1,5kg koncentrat / ditë.

Në javën e fundit sasia e pirjes 2 L çdo vakt reduktohet deri në zero litra.